

Rapidase® CB

Önologisches Enzym

Enzym für große Weißweine

*Rapidase® CB ist ein Enzympräparat welches mittels eines sorgfältig ausgewählten Stammes von *Aspergillus niger* produziert wird. Seine verstärkte Poly-Garacturonase-Aktivität ist besonders geeignet für eine optimale Vorbereitung qualitativ hochstehender weißer Traubenmoste für die Vergärung.*

Rapidase® CB enthält einen vernachlässigbar geringen natürlichen Gehalt an Cinnamylesterase. Der frische und fruchtige Charakter der Weine bleibt erhalten, auch bei Verwendung eines POF (+) Hefestammes.

Önologische Eigenschaften

- Erleichtert das Absetzen.
- Verbessert das Klärverhalten.
- Führt zu kompakteren Trubdepots.
- Begünstigt die Produktion von Hefeestern.
- Verbessert die Wirksamkeit der Schönungsmittel.



DSM Food Specialties

P.O. Box 1, 2600 MA Delft -The Netherlands
TRN 27235314

www.dsm-oenology.com / www.dsm-foodspecialties.com

zu beziehen bei:

Max F. Keller GmbH, Einsteinstraße 14a, D-68169 Mannheim, Telefon +49 (0) 621 32279-79, www.keller-mannheim.de

Physikalisch-chemische Eigenschaften

Rapidase® CB ist ein leicht anwendbares, gebrauchsfertiges Mikro-Granulat:

- Rapidase® CB ist zwischen 10° und 50° C aktiv.
Die Aktivität steigt mit der Temperatur. Übermäßige Hitze verringert die Aktivität von Rapidase® CB.
- Rapidase® CB ist im weintypischen pH-Bereich und bei normaler SO₂-Konzentration aktiv.
- Rapidase® CB wird durch Bentonit inaktiviert.

Anwendung

- Vor der Zugabe 100 g Enzym in einer 1-Liter-Lösung aus Wasser und Most (50:50) auflösen. Önologische Enzyme sind in Wasser verdünnt nur begrenzt haltbar.
- Zugabe zum Most nach dem Pressen, homogenisieren durch Umpumpen.
- Kontaktzeit: 6 bis 12 Stunden.

Dosage

- 1 bis 3 g/hl Most. Die benötigte Menge ist abhängig von der Traubensorte, der Temperatur und der Absetzzeit.
- Für Moste unter 10° C und für schnelleres Absetzen 30 ml der vorbereiteten Lösung pro hl Most anwenden.
- Für Moste über 10° C 10 ml der vorbereiteten Lösung pro hl Most anwenden.

Verpackung

- Rapidase® CB ist erhältlich in 100 g und 1 kg Dosen.

Lagerung

- Rapidase® CB kühl und trocken zwischen 5° und 15° C lagern.

Sicherheitshinweise

- Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Ein entsprechendes Sicherheitsdatenblatt steht zur Verfügung. S: 26, 28.1

Unlimited. **DSM**